

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



➤ LES DEPOTS DANS L'ESPACE INTERCELLULAIRE➤ GENERALITES

L'espace inter-cellulaire peut être le lieu de modifications lésionnelles diverses.

Ses lésions élémentaires concernent ses composants matriciels.

Ce milieu peut **abriter des dépôts de substances** diverses ou être **le lieu d'infiltrations**.

Ce chapitre expose les lésions dues à des dépôts.

➤ A/PROVENANCE DE DEPOTS

- ❖ Origine cellulaire : exp **hémossidérine** . **bilirubine**
- ❖ Origine plasmatique : protéines, oedème
- ❖ **Incrustation** ou **infiltration directe** (dans un but **esthétique pigment, botox,)**

➤ B/NATURE DES DEPOTS

- ❖ Des métaux : **Calcium, fer, cuivre**
- ❖ Composés chimiques : **urate de sodium, anthracose, silice, amiante.**
- ❖ Lipides : **flaques graisseuses** et **dépôts de cholestérol.**
- ❖ Protéine : **amyloses** ,
- ✓ Des dépôts **non pathologiques** sont produits dans un but **esthétique: tatouage**
- ✓ Certaines de ses substances qu'elles soient, organiques, minérales, métalliques ou organo-métalliques sont des pigments.
- ✓ **Le pigment étant une matière colorante et insoluble**

C/PATHOLOGIES DES DEPOTS INTERCELLULAIRES➤ 1/LES CALCIFICATIONS➤ DEFINITIONS

Les calcifications sont des formations très souvent rencontrées en pathologie.

Elles sont représentées par **l'accumulation anormale de sels minéraux** dont **le calcium** est prédominant.

La calcification onchondrale est un processus normal de minéralisation de l'os par les sels calciques.

En dehors du tissu osseux les calcifications sont pathologiques..

➤ NOMENCLATURE.

Leur description et leur nomenclature sont établies selon **le siège** ou **le tissu** qu'elles occupent.

Elles sont tout simplement dites calcifications lorsqu'elles se déposent dans **une zone de nécrose**.

- ❖ Les calcifications collectées dans un organe creux sont des **calculs**
- ❖ La calcification des parois vasculaires réalise **la médiacalcosse**.
- ❖ Il existe aussi **les sympexions, les calcosphérites, les spammomes.**

Les calcifications ne sont jamais décrites dans la cellule vue la mort obligatoire de la cellule dont le taux de calcium cytosolique augmente. Celles décrites en pathologie sont de **localisations extra-cellulaires** quelque soit leur type.

- ✓ **En dehors des calculs**, qui représentent une forme particulière, et selon **les circonstances de découvertes** on classe les **calcifications en dystrophiques** ou **métastatiques**

Les calcifications métastatiques

- ✓ sont en rapport avec **une hypercalcémie**,
- ✓ les dépôts se constituent **dans un tissu sain.**
- ✓ Le calcium circulant **dont le pH est devenu alcalin.**

Les calcifications dystrophiques

- ✓ correspondent **des dépôts de sels calciques** dans des zones tissulaires déjà **altérées** et **non viables.**
- ✓ Elles sont **focales** et **indépendantes** du taux de calcium sérique

➤ Mécanismes des calcifications.

Toute calcification produite en dehors du tissu osseux est pathologique.

- ✓ Les épithéliums de revêtements glandulaires altérés par une **dégénérescence** ou par une **néoplasie**, assurent un rôle **primordiale** dans l'apparition des calcifications.

Les calcifications apparaissent donc soit :

- ❖ **par simple précipitation** dans des points d'attache tissulaires et en rapport avec des **sécrétions à forte concentration** en sels calciques,
- ❖ soit **dans des cellules lésées (souffrantes)** qui augmentent leur teneur en calcium au niveau **des mitochondries** et de **la membrane plasmique**.

La **formation des cristaux** par la membrane cytoplasmique consiste à composer **des microcristaux** qui contribueront à **la genèse** de calcifications microscopiques.

- ✓ Les **taux élevés de calcium** et de **phosphates** **ne suffisent pas à eux seuls** pour **constituer des cristaux**: il faut **l'intervention de plusieurs éléments** capables d'induire la constitution de masses tissulaires calcifiées .

Ce sont:

- a. **Protéines adaptatrices de l'espace conjonctif régulent** la formation des calcifications :

1. **Les protéines ostéo-formatrices** tel que **l'ostéopontine**
 2. **les protéines inhibitrices** **MGP (Matrix Gla Pretein)** .
- b. **Facteurs moléculaires** intervenant dans l'ossification soit :
 1. **le Ca^{++}** lui-même,
 2. **les facteurs ostéogéniques** (tel que le **BMP=Bone Morphogenic Protein**),
 3. **des facteurs inhibiteurs** de la résorption

➤ Aspects morphologiques :

- **A l'examen macroscopique,** les calcifications apparaissent:

- ❖ **crayeuses,**
- ❖ **blanc jaunâtres,**
- ❖ de **tailles variables** allant du grain de sable à la plaque calcifiée dans **les vaisseaux de l'athérosclérose**.
- ❖ **A la coupe,** elles crient sous **le couteau**

- **A l'examen histologique** les calcifications sont :

- **basophiles,**
 - **amorphes,**
 - **granulaires** ou **lamellaires**
 - **extra cellulaires.**
- ✓ Qu'elles soient **dystrophiques** ou **métastatiques** elles présentent **les mêmes caractéristiques morphologiques**.

➤ DEPOTS DE PIGMENTS

➤ DEFINITION

- ❖ Substance **naturellement colorée** exogène ou endogène
- ❖ Substance **insoluble** dans les tissus
- ❖ de **nature variable** (organique, métallique, minérale)

➤ Pigments exogènes

- ❖ Essentiellement **le carbone**. ❖ **Encre de tatouage**

➤ 1/ Carbone

- ✓ Le **charbon**, les **hydrocarbures**, et le **tabac** consommés libèrent **des particules de carbones**.
- ✓ Ce pigment, lorsqu'on respire un **air pollué**, s'accumule dans les **ganglions lymphatiques intra-pulmonaires** et **médiastinaux**.
- ✓ Ce phénomène est **en général très bien toléré**
- ❖ Le carbone du tabac est associé à la **nicotine** qui est **cancérigène**.
- ❖ Donne une **coloration brunâtre**.

➤ 2/ Tatouage

- ✓ Introduction sous la peau de **pigments indélébiles** car **résistants à la destruction par les macrophages**.

➤ Pigments endogènes :

- ❖ **Fer**. ❖ **Mélanine**.
- ❖ **Cuivre**. ❖ **bilirubine**

➤ Pigment ferrique

- ✓ Le pigment ferrique correspond au **grains d'hemosidérine**
- ❖ lorsqu'il est **localisé** il s'agit d'une **hemosidérose** : cette affection est **bénigne**, et correspond à la **rupture de petits vaisseaux** au cours d'un **traumatisme**
- ❖ Lorsque la **répartition est diffuse**, il s'agit d'une **grave maladie génétique** qui est l'**hémochromatose** (**mutation chromosome 6 gène C282Y**). Le **taux sanguin de siderhémie** et de **transferrine** sont très élevés.

➤ Mélanine

- ✓ La mélanine est le pigment qui colore la **peau** et les **yeux** (sécrété et excrété par les **mélanocytes**)

Hyperpigmentation

- ✓ Provient **essentiellement** d'une **prolifération tumorale des mélanocytes**.
- ✓ Extrêmement fréquente sous sa **forme bénigne** (grains de beauté, éphélides, et naevus).
- ❖ **Congénitale** : **plaque plus ou moins étendue**, souvent associées à un **développement excessif de poil**. **Petit risque** de transformation cancéreuse.
- ❖ **Acquise** : taches pigmentées, surélevées ou planes, quelque fois framboisées en surface. Certaines ont un **risque de transformation maligne (mélanome)**.

Elle atteint la **peau** et les **muqueuses** dans l'**insuffisance surrénalienne**.

➤ Bilirubine

- ✓ Le pigment de l'**ictère** est l'**hème** provenant de la **dégradation de l'hémoglobine**.
- ❖ Il colore la **peau** et les **muqueuses**.
- ❖ Il fait suite à une **cholestase**.

➤ DEPOTS PROTEIQUES

➤ L'amylose

Définition: protéines fibrillaires **anormales** β **plissées**

Au 19ème siècle, Virchow la confond avec l'amidon, et la nomme Amyloïde .

La **diversité du composé protéique** fait qu'il n'existe pas de formule biochimique **unique** et **spécifique** de l'amylose.

Les dépôts tissulaires d'amylose se font à partir d'une matière première dite **précurseur** ou **protéine fibrogénique**;

Ce précurseur est différent **selon les étiologies**

L'amylose peut accompagner **des processus pathologiques inflammatoires, tumoraux** ou **dysmétaboliques**

➤ II/STRUCTURE ET COMPOSITION DE L'AMYLOSE.

Quelque soit le précurseur l'amylose s'édifie sur de **mêmes bases structurales** qui sont:

- ✓ La conformation en feuillets β **plissés**

La **microscopie électronique** qui dévoile **sa nature fibrillaire** :

- ✓ Elle constitue **des amas de fibres parallèles** avec des orientations différentes pour chaque amas.
- ❖ Les dépôts tissulaires de cette substance fibrillaire sont **toujours mêlés**, à faible pourcentage, à des **composés du tissu conjonctif** **constituant probablement des crampons** dans les sites pathologiques.

Composition d'un dépôt d'amylose :

95% Protéine fibrillaire + **5%** **Composant P**
Glycoprotéines
Lipoprotéines

- **Composant P** est une **protéine sérique** produite par **les hépatocytes**. Sa présence **constante** dans **tout type d'amylose** pourrait être responsable de **l'inhibition de la dégradation enzymatique** de **l'amylose** par **les protéases**.
- **Glycoprotéines des membranes basales** : Laminine, collagène de type IV et **Perlecan**
- **Lipoprotéine de transport du cholestérol** : Apolipoprotéine E

- **Les précurseurs fibrogéniques différents** vont produire les amyloses biochimiquement distinctes. La protéine responsable peut être :

- une hormone** (**calcitonine** dans le cancer médullaire de la thyroïde),
- une immunoglobuline** (dans le myélome multiple)
- autre protéine** (protéine de la phase aiguë de l'inflammation).

- Bien que les amyloses soient d'**origines différentes**, elles partagent **des caractères communs** qui permettent de leur faire partager **une même définition**. Toutes les amyloses présentent donc :

- des groupes de **protéines pathologiques** provenant
- de **précurseurs différents** et ayant en commun
- un agencement **biochimique** β **plissé**,
- une **répartition anatomique** extracellulaire,
- des **affinités tinctoriales**,
- une **structure fibrillaire** vue en microscopie électronique

III/ETUDE ANATOMO-PATHOLOGIQUE ET AFFINITES TINCTORIALES

- ✓ L'examen macroscopique des organes sièges de dépôts d'amylose ne possède plus l'intérêt qu'il avait au siècle dernier parce que, les thérapeutiques modernes et les antibiotiques empêchent l'évolution vers la chronicité de nombreuses affections.
- ✓ La microscopie optique révèle, dans l'espace conjonctif et les membranes basales, des dépôts éosinophiles tout affait homogènes et d'apparence hyaline (coloration HE).

l'amylose a des affinités tinctoriales particulières :

- ❖ Le rouge Congo révèle, en lumière polarisée, une biréfringence avec un reflet verdâtre très caractéristique.
- ❖ Les autres colorations sont abandonnées au profit de l'IHC
- ❖ Une scintigraphie au composé P* marqué permet d'établir la répartition des petits foyers amyloïdes.

➤ IV/NOMENCLATURE ET IDENTIFICATION DES SUBSTANCES AMYLOIDES

Les différentes substances amyloïdes sont désignées par une première lettre A (amylose) suivie par l'abréviation du type de protéine :


- AA = Amylose Associée, synthétisée par le foie
- AL = Amylose Light, dérivée des chaînes légères d'immunoglobulines plasmocytaires
- A med = Amylose de l'athérosclérose
- Aβ = Amylose de la maladie d'Alzheimer
- Aβ2m = Amylose des dialysés chroniques
- IAPP = Islet Amyloid PolyPeptide qui apparaît dans le diabète de type 2
- TTR = TransThyRétine

➤ V/CLASSIFICATION DES AMYLOSES

Elle est retrouvée dans une grande variété d'expressions cliniques. Les caractéristiques cliniques et étiologiques ne sont pas en rapport absolu avec les caractéristiques biochimiques et anatomiques .

La classification clinique se base sur la répartition anatomique des dépôts :

- ❖ Elle est dite systémique si plusieurs organes (le rein, la rate, le foie, le cœur, le tube digestif et la langue) sont atteints.
- ❖ Elle est localisée quand elle concerne un seul organe ou tissu.
- ❖ Elle est primitive sans cause évocable
- ❖ Elle est secondaire si elle fait suite à une inflammation chronique ou à un trouble immunologique



- ✓ Les protéines fibrillaires amyloïdosiques sont actuellement identifiées pour chaque maladie qui en comporte, et nous constatons qu'une même protéine telle que la transthyrétine peut composer une amylose primitive ou secondaire.
- ✓ Pour cela la meilleure classification est celle qui tiendrait compte de la clinique et de la protéine responsable.

➤ VI/PATHOGENIE

L'amylose représente le substratum anatomique d'une altération métabolique du précurseur.

ce précurseur est toujours soluble

Mais, l'amylose qui en provient est un composé fibrillaire intra-tissulaire solide et insoluble.

Plusieurs questions restent encore inexpliquées et sont les suivantes :

Les stimuli qui provoquent l'augmentation du taux du précurseur ne sont pas identifiés.

- Le taux du précurseur doit rester trop longtemps élevé (quelques années) pour les inflammations chroniques et la dialyse) mais apparaît presque simultanément dans la maladie d'Alzheimer et dans les tumeurs.
- L'altération d'une protéine n'est pas obligatoire pour constituer des dépôts d'amylose : une transthyrétine normale est retrouvée dans l'amylose cardiaque .